




COVID-19: Verdachtsabklärung und Maßnahmen

Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte

Verdachtsabklärung und Erstmaßnahmen



Folgendermaßen und Weiterversorgung







Ingenieur: Hebert Koch-Hellma, Illustration: Grafik, Gesebar-Generaldk; Stand: 24.03.2020; DOI: 10.25548/1917

Vorgehen bei laborbestätigtem COVID-19-Fall



Hinweise zur stationären Versorgung eines COVID-19-Falls

Stationäre Weiterversorgung

- 
Therapie
 Supportive Maßnahmen entsprechend Schwere der Erkrankung
 Beratung zu klinischen Fragen über das zuständige STAKOB-Behandlungszentrum
 Kontakt unter: www.rki.de/covid-19-therapie
- 
Hygiene
 Patient in Isolierzimmer, möglichst mit Vorraum
 Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille, geeigneter Atemschutz
www.rki.de/covid-19-hygiene
- 
Patiententransport im Krankenhaus
 Beschränkung auf unvermeidbare Transporte; Patient mit Mund-Nasen-Schutz
 Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, geeigneter Atemschutz, ggf. Schutzbrille
www.rki.de/covid-19-hygiene
- 
Reinigung und Desinfektion
 Tägliche Wischdesinfektion mit Mittel mit begrenzt viruzidem Wirkungsbereich
www.rki.de/desinfektionsmittelliste, www.rki.de/covid-19-hygiene
- 
Abfallentsorgung
 Gemäß LAGA-Vollzugshilfe 18 nach Abfallschlüssel 180103 als „infektiöse Krankenhausabfälle“
www.rki.de/laga-18
- 
Entlassung und Entisolierung
www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien

Weitere Informationen: www.rki.de/covid-19

Impressum: Faktenfinder-npqs-1.24-ens.de.dtm-Greisel-Governor.de-Stand 24.01.2020 COVID-19-25-61477